



BULLETIN n° 91 du 5 OCTOBRE 1989

CEREALES D'HIVER : J.N.O. : risques élevés.

COLZA : Altises : poursuite du vol.
Charançon du bourgeon terminal : 1ères captures
Tenthrèdes : dégâts localisés.
Phoma : quelques symptômes sur feuilles.

CAMPAGNOL TERRESTRE : SIGNALEZ-NOUS LES DEGATS.

CEREALES D'HIVER

Stade: Fin des semis à stade 1 feuille des orges d'hiver. Semis en cours à début de levée pour les blés.

PUCERONSSituation :

Présence de pucerons sur les maïs en cours de récolte et sur les repousses encore en place. Le vol se poursuit toujours modérément mais en légère progression (captures journalières à la tour variant de 25 à 50 pucerons).

Les premiers tests de virologie effectués sur des orges au stade 3 feuilles révèlent des taux d'infection de l'ordre de 50 %, c'est-à-dire que 50 pots d'orge sur 100 exposés 8 jours aux pucerons autour de la tour de Lavannes sont porteurs du virus de la jaunisse nanisante.

Préconisation :

Surveiller attentivement toutes les parcelles déjà levées et intervenir dès la présence de pucerons.

Rappel du seuil d'intervention 1 à 2 pieds/10 porteurs d'au moins un puceron.

COLZA

Stade variable selon les secteurs: 1 feuille vraie à 6 feuilles vraies étalées.

ALTISESSituation :

Les captures d'altises se poursuivent en tous secteurs :

Captures du 2/10 :

- Neuflize (08)	: 10
- Avaux (08)	: 5
- Rumigny (08)	: 5
- Crugny (51)	: 3
- Aix en Othe (10)	: 2
- Sommermont (52)	: 0
- Mathons (52)	: 0

Peu d'évolution au niveau des dégâts.

Préconisation :

Le stade de sensibilité est dans la plupart des cas dépassé. Seuls les colzas très tardifs doivent encore être surveillés.

CHARANCON DU BOURGEON TERMINALSituation :

Les 1ères captures sont signalées dans l'Aube à Villemaur/Vanne. La 1ère ponte a été observée à Ferme Neuve (10) sur une parcelle très précoce.


Préconisation :

Relever régulièrement les cuvettes jaunes. Les journées ensoleillées sont favorables au vol de cet insecte.

Un traitement est à réaliser dans les 10 à 15 jours après les 1ères captures.

Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone: 26.09.06.43

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL: 190 F



TENTHREDES

Situation :

Des dégâts localisés de larves de tenthrèdes sont signalés en particulier sur l'Aube. Ces larves de couleur gris foncé avec une bande gris verdâtre sur les côtés présentent 3 paires de pattes thoraciques et 8 paires de pattes abdominales.

Ces larves sont présentes compte-tenu des conditions climatiques très clémentes du printemps et de l'été.

Préconisation :

Pas de traitement justifié.

PHOMA

Situation :

Quelques symptômes sur les lères feuilles.

Préconisation :

Tout traitement est déconseillé (cf note "pieds secs" du dernier bulletin).

LE CAMPAGNOL TERRESTRE

Durant l'hiver 1988-1989, des dégâts de campagnol terrestre nous avaient déjà été signalés. Des pullulations importantes s'étaient produites dans la zone du Grand Bassigny dans la Haute-Marne.

A nouveau la présence de ce rongeur nous est signalé localement dans chacun des 4 départements de Champagne-Ardenne.

Afin de prendre en temps voulu les mesures de lutte, très spécifiques, contre ce rongeur, nous souhaiterions être informés des secteurs qui subissent des attaques.

Rappelons au préalable quelques caractéristiques afin d'éviter les confusions avec les campagnols des champs et la taupe.

- Campagnol terrestre : petites taupinières, souvent groupées, galeries descendant en oblique, diamètre : 8 cm.
- Taupe : taupinières plus importantes ; galeries verticales, diamètre : 6 cm maximum.
- Campagnol des champs : pas de taupinière, pistes entre les orifices des galeries, de diamètre 3 à 5 cm.

VOUS ETES INTERESSE PAR LE SUPPLEMENT AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLES ...

PENSEZ A NOUS RETOURNER LE COUPON-REPOSE PARU SUR NOTRE DERNIER BULLETIN.